

AGÁR SISAKOSKOSBOR (*Anacamptis morio*)

JELLEMZÉSE:

A kosborfélék közé tartozó egyik leggyakoribb orchideánk. Hajtásai 13-35 cm-esek, tőlevélrózsáját 5-8 széles-lándzsás, két szélén felhajló, 5-15 cm hosszú levél alkotja. A száron 3-6 levél található. Murvalevelei vöröses vagy bíboros színűek.

A virágzata laza, 5-14 virágból áll, színük fehértől a sötétbíborig változhat. A lepellevelek sisakszerűen összeborulnak, zöldesen vagy ibolyásan ereztettek. A mézajkak enyhén háromkaréjúak, középső részükön halványabb színű mintázat található. Április közepétől május végéig virágzik.








ÉLŐHELYE:

Élőhelyét tekintve nem válogatós, hazánkban kaszálókon, pusztafüves lejtőkön, hegyi-, homoki-, láp- és ritkábban mocsárréteken, szikes- és homokpusztákon, legelőkön, cseres-tölgyesekben, gesztenyésekben él.




Elterjedési térkép (FHNPI)

-  *Anacamptis morio*
-  Védett területek
-  GYMS_megyehatár



FŐBB VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK:

-  Élőhely: megszűnés, fásítás, erős zavarás, taposás, inváziós fajok térhódítása, a legeltetési állattartás visszaszorulása, mezsgyék feltörése, beszántása, tarlóégetés